



# AERO-VAC<sup>®</sup>

VACUNA INACTIVADA AEROMONA SALMONICIDA ATÍPICA. SUSPENSIÓN PARA INMERSIÓN

## Código

401747

## Composición

Cada 1 mL contiene:

*Aeromonas salmonicida atípica*, cepa Asa 285 6 –  $8 \times 10^8$  UFC

Excipientes c.s.p. 1 mL

Adyuvante: Polímero acuoso

Inactivante: Formaldehido

## Especie de destino

Salmón del Atlántico (*Salmo salar*) y Trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*).

## Indicaciones

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Furunculosis causada por *Aeromonas salmonicida* atípica, en Salmón del Atlántico y Trucha arcoíris, a partir de los 4 gramos de peso.

## Dosis, vía de administración y modo de empleo

La biomasa posible de inmunizar por unidad de volumen de suspensión vaccinal es de 35 kg/L de vacuna. Sumergir los peces durante 1 hora para que el proceso de vacunación sea óptimo. El protocolo de vacunación consta de 1 inmunización, a partir de los 4 gramos de peso.

Agitar vigorosamente antes de usar. Se debe detener el flujo de agua en el estanque y mantener con un mínimo de 8 ppm de oxígeno disuelto (DO). Preparar una dilución de 1 L de vacuna por cada 1.000 L de agua dulce del estanque. Para ello, previamente se diluye 1 L de la vacuna en 10 L de agua dulce del estanque. Luego, esta solución se aplica al estanque con 990 L de agua dulce para su debida homogenización. Una vez preparada la dilución, la vacunación se deben realizar en el lapso máximo de 2 horas.

## Contraindicaciones

- No vacunar durante el proceso de smoltificación.
- No vacunar peces reproductores.
- No efectuar otros tratamientos con los peces durante el proceso de vacunación.



# AERO-VAC®

VACUNA INACTIVADA AEROMONA SALMONICIDA ATÍPICA. SUSPENSIÓN PARA INMERSIÓN

- No vacunar peces enfermos, débiles o estresados.
- No vacunar peces con lesiones o infecciones cutáneas o branquiales, ni en situaciones de déficit de oxígeno o presencia de algas y/o microalgas.
- No vacunar peces que hayan sido recientemente transportados desde otro lugar al sitio de vacunación, incluyendo un tiempo mínimo de 12 horas de descanso pre-vacunación.

## Efectos no deseados y reacciones adversas

No se conocen efectos indeseados asociados a la aplicación de la vacuna.

## Advertencias y precauciones especiales de uso

- No exceder la aplicación por más de 1 hora y 15 min.
- La aplicación debe hacerse a peces con ayuno previo de 24 horas.
- Los peces deben nadar libremente en el estanque durante la aplicación de la vacuna, no superando una densidad de 35 kg/m<sup>3</sup>.
- No realizar más de 20 inmersiones con la misma solución preparada 1:1000.
- No aplicar cuando las condiciones del agua estén alteradas especialmente por presencia de materia orgánica y sedimentos que aparecen después de las lluvias.
- Una vez aplicada la vacuna, no trasladar los peces al mar antes de las 600 UTA.
- Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

## Período de resguardo

0 grados días.

## Condición de venta

Venta bajo receta médico-veterinaria.

## Fabricado y distribuido por Veterquímica S.A.

## Razón de cambio

Actualización de formato (02-05-2023)

**USO VETERINARIO**  
**REG. PROV. SAG N°2243-BP**



**VETERQUÍMICA®**  
CREANDO SALUD ANIMAL